



H11 - Pahnueen vaihto

Jos emakon maidontuotanto on lakannut, voi elinvoimaiset porsaat saada maidontuotannon uudelleen käyntiin.

1. Jos koko pahnue osoittaa merkkejä huonosta kasvusta, siirrä ne emakolle jolla on paljon maitoa.
2. Emakolla, joka saa pahnueen, pitää olla isot, hyvinvoivat ja tasaisen kokoiset porsaat.
3. Emakko, joka saa pahnueen, pitäisi olla nuori.
4. Vaihda pahnueet heti, eli varmista ettei mikään emakko milloinkaan jää ilman porsaita.
5. Emakoilla, joille vaihdetaan pahnue, on oltava sama määrä porsaita.
6. Vaihdon jälkeen huomioi ryhmä jossa pienet porsaat. Aseta esimerkiksi lämpölamppu karsinaan.
7. Älä säädä emakoiden ruokintaa pahnueen vaihdon yhteydessä.



Hyvin hoidettu pahnueen vaihto

Pahnueen vaihto epäonnistui jos:

- vaihto tapahtui liian myöhään, porsaat ovat liian heikot jaksakseen imeä.
- Emakko jolla oli heikkoja porsaita, on sairas.
- Porsaat jotka kasvavat huonosti ovat sairaita.
- Emakko makaa mahallaan tai seisoo paljon → porsaat eivät saa maitoa.
- porsaat ovat levottomia – luultavasti koska emakko ei anna niiden imeä.



Pahnue on siirretty liian myöhään, porsaat ovat heikkoja



Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin



Lisäkommentteja – Pahnueen vaihto

Ennen pahnueen vaihtoa pitää varmistaa, että kaikki muut asiat ovat kunnossa (katso H14 – Porsimisosaston valvonta, H15 – Emakoiden sairaudet ja hoito, ja H16 – Porsaiden sairaudet ja hoito).

1. Yleensä pahnueen vaihto on tarpeellista ainoastaan ensimmäisen tai toisen viikon aikana porsimisesta. Vaihda kahden emakon porsaat keskenään, kun kaikki tai useimmat porsaat pahnueessa kärsivät huonosta kasvusta. Jos vain muutama porsasta kärsivät huonosta kasvusta, katso H12 – sijaisemo heikentyneille porsaille
2. Emakolla jolle annetaan heikot porsaat pitää olla hyvä maidontuotanto, että porsaat saavat maitoa nopeasti. Isot vaihdetut porsaat alkavat nopeasti imemään ja saavat siten maidontuotannon käyntiin emakolla, jolla oli vähäinen maidontuotanto.
3. Nuoret emakot hyväksyvät uuden pahnueen nopeasti.
4. Aika on olennaista, koska pienet heikot porsaat eivät pärjää kauan. Tarkista että ne imevät, koska ne eivät aina ole tarpeeksi vahvoja stimuloimaan emakon utaretta.
5. Kun koko pahnue siirretään, ei porsaiden tarvitse tapella arvojärjestyksestä. Siksi pitää aina tarkistaa, että emakoilla on toimivia nisiä kaikille porsaille.
6. On elintärkeätä, että porsaille on optimaalinen ympäristö. Katso H13 – Porsaiden ympäristö; H23 – Porsaiden ruokinta.
7. Älä säädä ruokintaa vaihtopäivänä emakoille, joilla pahnueet vaihdetaan. Tarkista emakoiden syönti – varsinkin ensimmäiset kaksi päivää pahnueen vaihdon jälkeen. Jos emakko jolta pienet porsaat siirrettiin pois, ei pysty tuottamaan maitoa, voi olla tarpeen siirtää pahnue sijaisemolle. (katso H12 – Sijaisemo heikentyneille porsaille)

