

## Produktiva Diko Infokort

### Kalvhälsa

- Hur många kalvar man får är en betydande del av dikogårdens lönsamhet. Detta kan man påverka både genom att säkerställa dräktighet och genom att minska kalvdödligheten.
- Det är viktigt att känna igen svaga kalvar vid kalvningen och hålla en extra öga på dessa i några veckor
  - Ytlig andning, pauser i andningen
  - Lyfter inte huvudet
  - Stiger inte genast efter kalvningen på bröstkorgen (normalt inom 2-3 min)
  - Försöker stiga upp långsammare än vanligt (normalt inom 15-30 min)
  - Svag sugreflex, ofta är orsaken den, att kalven som haft syrebrist har kroppen blivit för sur p.g.a. samlad koldioxid
- Orsaken till kalvens svaghet är ofta syrebrist, för tidig födsel (liten kalv, silklik päls), infektion eller utvecklingsstörning
- En nyfödd kalv har inte antikroppar i blodcirkulationen så en tillräcklig intag av råmjölk genast efter födseln (inom 2 h) har en stor betydelse med tanke på framtiden
- Nyfödda kalvars vanligaste infektioner är navel- och ledinflammationer
- Kalvens hälsa stöds av att dess omgivning är rent och tillräckligt rymligt, dessa kan man aldrig satsa för mycket på!

- Normal kroppstemperatur hos kalvar 38,5 - 39,5 °C
- Normal andningsfrekvens hos kalvar är 20 - 40 ggr/min (nyfödda 45-60)
- Normal puls 72 - 92 slag/min (nyfödda 100-140)
- Speciella sjukdomsympton som bör övervakas:
  - Feber över 39,4°C två gånger
  - Dålig sugeffekt/aptit, diarré
  - Hosta, rinnande ögon eller näsa, försvårad andning
  - Huvudets ställning, trötthet, ovilja att stiga upp, hälla, navel- eller ledsvullnad

